

# Stratégie de dépistage COVID-19 en CHSLD

Catégorie	CHSLD sans éclosion	CHSLD avec un étage en éclosion *	CHSLD avec plus d'un étage en éclosion *
<b>Employés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAAN minimalement à chaque deux semaines en absence de symptômes (sauf les guéris)</li> <li>• TAAN exigé dès l'apparition de symptômes typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)</li> <li>• Si un employé teste positif, on teste tous les autres employés du site dans les 5 à 7 jours qui suivent le dernier dépistage systématique des employés de ce centre. Si le dernier dépistage systématique remonte à plus de 7 jours, tester immédiatement tous les employés du site. Répéter les tests hebdomadaires jusqu'à ce que tous les employés aient eu des tests négatifs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAAN suggéré à chaque à semaine en l'absence de symptômes (sauf les guéris)</li> <li>• TAAN exigé dès l'apparition de symptômes typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAAN suggéré chaque semaine en l'absence de symptômes (sauf les guéris)</li> <li>• TAAN exigé dès l'apparition de symptômes typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)</li> </ul>
<b>Résidents asymptomatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si employé testé COVID positif, effectuer TAAN des résidents susceptibles** (étage (s) où l'employé a travaillé dans les 14 derniers jours). Si l'étage est inconnu, ou si l'employé a travaillé sur plusieurs étages, effectuer TAAN des résidents de tous les étages du site.</li> <li>• TAAN systématique des résidents susceptibles** des sites ayant présenté peu ou pas de cas COVID minimalement une fois par mois selon la situation épidémiologique locale / communautaire.</li> <li>• Si la situation est épidémique dans la communauté, faire le dépistage toutes les deux semaines des résidents susceptibles**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès le début de l'éclosion, effectuer TAAN des résidents susceptibles ** de l'étage concerné</li> <li>• Effectuer TAAN des résidents susceptibles ** de l'étage en éclosion chaque semaine pendant toute la durée de l'éclosion</li> <li>• Effectuer TAAN des résidents susceptibles* des étages non en éclosion à chaque deux semaines</li> <li>• Si des employés sont dépistés positifs, effectuer TAAN des résidents susceptibles** des unités où l'employé a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès le début de l'éclosion, effectuer TAAN des résidents susceptibles ** des étages concernés.</li> <li>• Effectuer TAAN des résidents susceptibles ** des étages en éclosion chaque semaine pendant toute la durée de l'éclosion</li> <li>• Effectuer TAAN des résidents susceptibles** des étages non en éclosion à chaque deux semaines minimalement ou chaque semaine si centre très touché</li> <li>• Si des employés sont dépistés positifs, effectuer TAAN des résidents susceptibles** des unités où l'employé a travaillé dans les 14 derniers jours.</li> </ul>

Catégorie	CHSLD sans éclosion	CHSLD avec un étage en éclosion *	CHSLD avec plus d'un étage en éclosion *
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Étages d'errance ou non-respect des consignes de distanciation (troubles de comportement) impliquant plusieurs résidents blancs: dépistage aux deux semaines</li> <li>Unité où beaucoup de mouvements, de visiteurs, unités de courte durée, unités où beaucoup de va-et-vient: dépistage aux deux semaines</li> </ul>	travaillé dans les 14 derniers jours. Si l'étage est inconnu, ou si l'employé a travaillé sur plusieurs étages, effectuer TAAN des résidents susceptibles* de tous les étages du site	Si l'étage est inconnu, ou si l'employé a travaillé sur plusieurs étages, effectuer TAAN des résidents susceptibles** de tous les étages du site.
<b>Résidents suspectés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAAN suggéré dès l'apparition de symptômes (ex. toux, fièvre, etc.). Si le test est négatif, il peut être répété après 48-72h si la suspicion est sérieuse et persiste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAAN suggéré dès l'apparition de symptômes (ex. toux, fièvre, etc.). Si le test est négatif, il peut être répété après 48-72h si la suspicion est sérieuse et persiste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAAN suggéré dès l'apparition de symptômes (ex. toux, fièvre, etc.). Si le test est négatif, il peut être répété après 48-72h si la suspicion est sérieuse et persiste.</li> </ul>
<b>Résidents COVID +</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>TAAN de guérison au jour 17</li> <li>Si négatif: refaire TAAN 24h après le premier test négatif</li> <li>Si positif: refaire TAAN aux 72h jusqu'à l'obtention d'un test négatif puis répéter le test 24h après le premier test négatif</li> <li>Ne plus tester après 28 jours depuis le début de la maladie si absence de symptômes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAAN de guérison au jour 17</li> <li>Si négatif: refaire TAAN 24h après le premier test négatif</li> <li>Si positif: refaire TAAN aux 72h jusqu'à l'obtention d'un test négatif puis répéter le test 24h après le premier test négatif</li> <li>Ne plus tester après 28 jours depuis le début de la maladie si absence de symptômes</li> </ul>

\*Éclosion: présence d'un cas positif non isolé et de source inexpliquée sur un étage ou dans une section d'une unité (selon la configuration architecturale des centres) desservie par une équipe de travailleurs, auprès d'un même groupe de résidents

\*\*Résidents susceptibles: résidents jamais atteints de la COVID et asymptomatiques (blancs). Les résidents guéris (verts) ne sont dépistés que lorsqu'ils sont symptomatiques, après plus de 3 mois du début de leur infection.