



RECOMMANDATIONS POUR CLINIQUES PRIVÉES PANDÉMIE COVID-19

Désinfection des Salles en Clinique

● Préparation:

- A – Lavage des mains
- B – Enfiler une jaquette de protection
- C – Port de gants
- D – Remplissage des distributeurs de solution Hydroalcoolique (SHA) ou des lavabos équipés de savon et de papiers à main

● Produits à utiliser:

- Choix 1.** Peroxyde d'Hydrogen (*AccelPrevention*)
- Choix 2.** Détergent avec Hypochlorite de sodium (*Chlorox*)
- Choix 3.** Ammonium Quaternaire (*Lingettes Carvi*)
- Choix 4.** Hypochlorite de Sodium (*Eau de Javel* 1:10 soit une partie de solution 5 à 6% *Javel* pour 9 parties d'eau; fraîchement préparée à chaque 24 heures)

● Nettoyage Quotidien et Régulier:

Notes : *Salle d'examen: nettoyage et désinfection entre chaque usager suspecté.

**Salle d'attente: nettoyage et désinfection selon l'achalandage : chaque heure, chaque 2 heures, ou autre*

**Effectuer le changement de linge microfibre à chaque étape ci-dessous*

1. Environnement

- 1.1. Interrupteurs, poignées de porte, distributeurs, rebords des fenêtres
- 1.2. Téléphones, murs (tâches), petits équipements, chaises, bureaux
- 1.3. Limiter la quantité de matériel dans les salles d'examens

2. Toilette

- 2.1. Interrupteurs, poignées, miroirs, distributeurs à papier et savon, éviers
- 2.2. Distributeurs à papier de toilette, barres d'appui
- 2.3. Dessus, dessous et côtés de la cuve de la toilette, sièges de toilette et ses encrages, chasses d'eau

3. Vider les poubelles selon les catégories habituelles (généraux, biomédicaux, pharmaceutiques, cytotoxiques, etc.)

4. Effectuer le lavage à plat des planchers à l'Ammonium Quaternaire

5. Retirer l'Équipement de Protection Individuelle (ÉPI) et se laver les mains

6. Nettoyer et désinfecter les outils utilisés avec les produits désinfectants et se laver les mains



RECOMMANDATIONS POUR CLINIQUES PRIVÉES PANDÉMIE COVID-19

Utilisation de l'Équipement de Protection Individuelle (ÉPI)

- **L'Équipement de Protection Individuelle (ÉPI) comprend:**
 - ✓ Masque chirurgical régulier
 - ✓ Protection Oculaire (lunette ou visière)
 - ✓ Gants
 - ✓ Blouse à manche longue
- **Mesures pour les travailleurs de la santé:**
 - Masque de procédure pour tous les travailleurs de la santé à moins de 2 mètres de l'utilisateur;
 - Protection oculaire à usage unique (écran facial ou lunettes protectrices). Les lunettes de prescription ne sont pas considérées comme une protection adéquate. Les lunettes de protection doivent être lavées selon le protocole et réutilisées pour éviter une rupture de stock;
 - Blouse à manche longue non stérile, à usage unique et jetable (prévoir une blouse imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques ex. : vomissement);
 - Gants non stérile à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets;
 - S'abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement contaminées;
 - S'assurer de la disponibilité des Équipements de Protection Individuelle (ÉPI) en tout temps;
 - La salle d'examen doit être épurée au maximum et ne doit contenir que le strict minimum;
 - Retirer l'ÉPI dans la salle examen avant la sortie, à deux mètres du patient, et se laver les mains.

AVIS IMPORTANT



RECOMMANDATIONS POUR CLINIQUES PRIVÉES PANDÉMIE COVID-19

Manipulation des Prélèvements

- **Ne pas faire de prélèvements COVID-19, les référer aux centres désignés**
- **Pour la manipulation des spécimens autres que COVID-19:**
 - ✓ Décontaminer l'extérieur des tubes de prélèvements avec le désinfectant habituellement utilisé;
 - ✓ Identifier les tubes;
 - ✓ Placer les tubes dans un sac pour spécimen biohazard;
 - ✓ Placer le formulaire de demande de laboratoire dans la pochette externe. Inscire COVID-19 suspecté le cas échéant;
 - ✓ Placer les tubes dans le contenant déterminé pour l'acheminement au laboratoire de référence. Si requis, aviser avant l'envoi des spécimens;
 - ✓ Respecter les indications pour la conservation des spécimens.
- **Pour le transport des spécimens autres que COVID-19:**
 - ✓ S'assurer que le personnel qui transporte les tubes porte des gants et s'assure d'une hygiène des mains par la suite.

AVIS IMPORTANT



RECOMMANDATIONS POUR CLINIQUES PRIVÉES PANDÉMIE COVID-19

Gestion des immeubles des cliniques

- Limiter les points d'entrées aux immeubles des cliniques
- Limiter l'entrée des personnes dont la visite aux immeubles des cliniques n'est pas nécessaire
- Placer des affichages de mesures préventives et d'informations sur la pandémie COVID-19 aux portes d'entrée des cliniques, dans les ascenseurs et autres espaces publics dans les immeubles des cliniques