



\*SM03126\*



\*HOPITAL06C\*

## ORDONNANCE MÉDICALE

Hôpital  Hébergement  Réadaptation  1<sup>re</sup> ligne

Poids : \_\_\_\_\_ kg    Taille : \_\_\_\_\_ cm    Allergie (s) : \_\_\_\_\_    Aucune  
connue :  Réactions indésirables aux médicaments : \_\_\_\_\_

### ACCUEIL CLINIQUE - HÉMATURIE MACROSCOPIQUE - 1<sup>re</sup> ligne

1/2

La personne référée répond aux critères d'admissibilité de l'Accueil Clinique et ne présente aucune des contre-indications spécifiques à la condition clinique visée (*voir verso*)

#### LABORATOIRES ET EXAMENS DIAGNOSTIQUES

- FSC, coagulogramme, urée, créatinine, électrolytes, analyse/culture d'urine, b-hCG (si en âge de procréer) ≤ 72h
- Pyéloscan ≤ 7 jours **OU**
- Uroscan ≤ 7 jours (*si allergie aux produits de contraste, DFG<sub>e</sub> < 60mL/min, ou créatinine > 130*)
- Cytologie urinaire DIE x 3 jours consécutifs
- Analyse d'urine de contrôle 2 à 6 semaines post antibiothérapie

#### ANTIBIOTHÉRAPIE

- À initier si A/C urinaire positive pour infection

- 1<sup>re</sup> choix: Triméthoprime-Sulfaméthoxazole 160/800mg : 1 comprimé PO BID x 5 jours
- 2<sup>e</sup> choix (si allergie aux sulfamidés) : Nitrofurantoïne longue action 100 mg : 1 capsule PO BID x 5 jours
- Autre : \_\_\_\_\_

#### CONSULTATION

- Urologie (cytoscopie)
  - ≤ 72h si A/C d'urine négative pour infection **ET** hématurie DIE persistante
  - ≤ 14 jours si A/C d'urine négative pour infection **ET** hématurie intermittente
  - ≤ 6 semaines si GR négatifs sur A/C d'urine de contrôle post antibiothérapie **ET** sexe masculin assigné à la naissance **ou** âge > 40 ans **ou** tabagisme

Nom du médecin référent (en lettres moulées) : \_\_\_\_\_ N° permis : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

No. de téléphone de la clinique : \_\_\_\_\_

TÉLÉCOPIEUR DE L'ACCUEIL CLINIQUE : HND : 514-362-2829    HV : 514-765-8529



\*SM03126\*



\*HOPITAL06C\*

## ORDONNANCE MÉDICALE

### HÉMATURIE MACROSCOPIQUE – ACCUEIL CLINIQUE (1<sup>re</sup> ligne)

2/2

#### Critères d'exclusion

- Saignement urinaire abondant
- Rétention urinaire
- Atcd de chirurgie urologique ***\*diriger vers le chirurgien, le cas échéant\****
- Douleur intense non soulagée par analgésie
- Rein unique

#### Critères généraux d'admissibilité

- L'utilisateur nécessite une prise en charge dans un délai d'au plus 72h, sans qu'une hospitalisation ou un temps d'observation sur civière ne soit requis.
- L'utilisateur est âgé.e de 16 ans ou plus **et** n'est pas enceinte.
- La condition clinique est stable.
- L'utilisateur peut se déplacer seul.e, ou est accompagné.e pour assurer ses déplacements.
- L'utilisateur ne présente pas une problématique de santé mentale instable ou un trouble cognitif non compensé par un réseau de soutien significatif.

Nom du médecin référent (en lettres moulées) : \_\_\_\_\_ N° permis : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

No. de téléphone de la clinique : \_\_\_\_\_

TÉLÉCOPIEUR DE L'ACCUEIL CLINIQUE : HND : 514-362-2829 HV : 514-765-8529

Entérinée par l'exécutif du CMDP du CIUSSS le 12 décembre 2024