



## SUIVI DES ANTIPSYCHOTIQUES

**Les antipsychotiques sont associés à de nombreux effets secondaires et à une augmentation du risque d'accidents cérébrovasculaires et de mortalité chez les individus avec démence. Leur utilisation est donc restreinte à une certaine surveillance.**

**Indication :**

Démence et psychose sévère	<input type="checkbox"/>	Dépression résistante	<input type="checkbox"/>
Démence et agitation sévère	<input type="checkbox"/>	Maladie bipolaire	<input type="checkbox"/>
Démence et agressivité sévère	<input type="checkbox"/>	Schizophrénie	<input type="checkbox"/>
Autre, spécifier : _____			

**Consentement obtenu :**

Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	--------------------------

**Prescription de départ :**

Risperidone	<input type="checkbox"/>	Aripiprazole	<input type="checkbox"/>
Quétiapine	<input type="checkbox"/>	Halopéridol	<input type="checkbox"/>
Olanzapine	<input type="checkbox"/>	Autre : _____	<input type="checkbox"/>

**Date de début de l'antipsychotique (si précède la première visite) :** \_\_\_\_\_

### Facteurs de risques vasculaires présents :

Hypertension artérielle	<input type="checkbox"/>	Dyslipidémie	<input type="checkbox"/>
Diabète	<input type="checkbox"/>	Arythmie	<input type="checkbox"/>
MCAS/MVAS	<input type="checkbox"/>	AVC	<input type="checkbox"/>
Obésité	<input type="checkbox"/>	Tabagisme	<input type="checkbox"/>

### Présence de contre-indications :

Maladie de Parkinson	<input type="checkbox"/>	Démence à Corps Lewy	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

Date	1ère visite Date : _____	1 mois Date : _____	2 mois Date : _____	3 mois Date : _____	6 mois Date : _____	12 mois Date : _____
$\Delta$ de dose						
Indication toujours présente?						
Tentative de sevrage si stable						
<u>Poids (kg)</u>						
<u>Circonférence abdominale (cm)</u>						
<u>IMC (kg/m<sup>2</sup>)</u> Taille : _____						
<u>Glycémie à jeun (mmol/L)</u> Base, 3 mois, q année						
<u>Tension artérielle (mmHg)</u> Base, 3 mois, q année						
<u>Bilan lipidique à jeun (mmol/L)</u> Base, 3 mois, q 5 ans						
<u>ECG (arythmie?)</u> <u>Intervalle QTc<sub>c</sub></u>						
<u>Effets secondaires extrapyramidaux, trouble de la marche et chute</u>						

