

**ORDONNANCE COLLECTIVE  
N° OC-28**

Rédigé/révisé par Suzanne Gilbert, chef du  
département de pharmacie

En collaboration avec la Direction des programmes-  
clientèles

Date d'entrée en vigueur : Décembre 2011

Date de révision : 2012-02-20

Approuvé par résolution n° 2012-02.57 du CMDP

**Administration de  
diphénhydramine  
(Bénadryl<sup>mc</sup>) injectable  
en lien avec la règle d'utilisation  
du Fer intraveineux – Fer sucrose  
Venofer<sup>mc</sup> (R1)**

**Infirmières et infirmiers**

**CLIENTÈLE VISÉE**

Usagers de l'hôpital de jour, de l'unité de courte durée gériatrique, de l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive et du programme d'hébergement en soins de longue durée qui reçoivent du fer par voie intraveineuse selon la règle d'utilisation en vigueur.

**PROFESSIONNELS VISÉS**

Infirmières et infirmiers

**INDICATIONS CLINIQUES**

Présence d'effets indésirables lors de l'application de la règle d'utilisation des médicaments n° R-1 Fer intraveineux – Fer sucrose Venofer<sup>mc</sup>

- Présence d'urticaire, de prurit ou de rash
- Présence d'une réaction anaphylactique (difficulté respiratoire, etc.)

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la diphenhydramine ou à tout composant de la formulation.

**PROCÉDURE**

Dose à administrer et voie d'administration à utiliser :

- 50 mg soit 1 mL par voie intraveineuse directe en 1 à 2 minutes ou intramusculaire

**EFFETS INDÉSIRABLES**

- Cardiovasculaire : serrement dans la poitrine, extrasystoles, hypotension, palpitation, tachycardie.
- Système nerveux central : frissons, confusion, convulsion, perturbation de la coordination, étourdissements, euphorie, excitation, fatigue, maux de tête, insomnie, irritabilité, nervosité, excitation paradoxale, sédation, vertiges.
- Dermatologique : photosensibilité, rash, urticaire.

Administration de diphénhydramine (Bénadryl<sup>mc</sup>) injectable  
en lien avec la règle d'utilisation du Fer intraveineux – Fer sucrose Venofer<sup>mc</sup> (R1)

---

- Gastro-intestinal : anorexie, constipation, diarrhée, sécheresse des muqueuses, détresse épigastrique, nausée, serrement de la gorge, vomissement, xérostomie.
- Génito-urinaire : difficulté à uriner, fréquence urinaire, rétention urinaire.
- Hématologique : agranulocytose, anémie hémolytique, thrombocytopénie.
- Neuromusculaire : névrite, paresthésie, tremblement.
- Oculaire : vision brouillée, diplopie.
- Otique : labyrinthite aigue, *tinnitus*.
- Respiratoire : congestion nasale, épaissement des sécrétions bronchiques, *wheezing*.
- Autres : diaphorèse, choc anaphylactique.

### Notation au dossier médical

Lorsqu'une infirmière utilise un médicament en lien avec cette ordonnance collective, elle inscrira sur le formulaire intitulé *Prescription médicale* (UGM-133) le titre de l'ordonnance collective et son numéro, le nom du médicament, la posologie, la date et l'heure. Elle signera son nom au long et acheminera le tout au département de pharmacie selon la procédure en vigueur.

### RÉFÉRENCES

- Règle d'utilisation des médicaments no R-1 Fer intraveineux – Fer sucrose Venofer<sup>mc</sup>
- Lexicomp, Diphenhydramine dans Lexi-Drugs

### APPROBATION

*Original signé par*

---

Directeur des programmes clientèles

*Original signé par*

---

Directrice du développement et des affaires médicales

*Original signé par*

---

Présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

M:\DSP\DSP\_CMDP\OUTILS\_CLINIQUES\Ordonnances collectives\Ordonnances\_en\_preparation\OC-28\_12\_Diphenhydramine\_injectable.doc