

ROUGEOLE : EXPOSITION DE CENTAINES DE PERSONNES AU PALAIS DES CONGRÈS ET À L'AÉROPORT DE MONTRÉAL, DU 23 AU 26 NOV.

8 décembre 2024 (la mise à jour est surlignée en jaune)

Un cas confirmé de rougeole, non-vacciné, diagnostiqué suivant le retour dans son pays d'origine aurait potentiellement exposé des centaines de personnes à Montréal durant sa période de contagiosité entre le 23 et le 26 novembre 2024. Il s'agit de la première exposition à un cas de rougeole contagieux à Montréal depuis le mois de juillet.

Les lieux exposés par le cas incluent les suivants :

- La 70e Session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN au **Palais des congrès** de Montréal :
 - Le 23 novembre : entre 8h15 et 19h30 (plages horaires exactes de présence du cas inconnues) ;
 - Le 24 novembre : entre 9h00 et 19h30 (plages horaires exactes de présence du cas inconnues) ;
 - Le 25 novembre : entre 8h45 et 18h00 (plages horaires exactes de présence du cas inconnues).
- L'**hôtel Humaniti Montréal** (340, rue De la Gauchetière Ouest) du 23 au 26 novembre ;
- Un événement privé au **Cirque Éloïze** (417, rue Berri) du 24 novembre à 19h jusqu'au 25 novembre à 1h30 ;
- L'**aéroport de Montréal**, le 26 novembre avant 17h09 (plages horaires exactes inconnues) ;
- Le **vol AC417** (Air Canada) ayant quitté l'aéroport de Montréal (porte A49) le 26 novembre à 15h09 en route vers l'aéroport de Toronto-Pearson (porte D31), atterri à 16h38 ;
- L'**aéroport de Toronto-Pearson** le 26 novembre entre 16h38 et 21h18 ;
- Le **vol AC890** (Air Canada) ayant quitté l'aéroport de Toronto-Pearson (porte E71) à 19h18 le 26 novembre en route vers l'aéroport de Rome-Fiumicino, Italie (terminal 3), atterri le 27 novembre à 9h40.

Dans le cadre de l'Assemblée, les participants, notamment le cas de rougeole, ont aussi pu fréquenter les lieux suivants :

- L'**hôtel Westin Montréal** (70, rue Saint-Antoine Ouest) entre le 23 et le 26 novembre ;
- L'**hôtel DoubleTree par Hilton Montréal** (1255, rue Jeanne-Mance) entre le 23 et le 26 novembre.

Veillez consulter la liste des lieux exposés au Québec sur la page éclosion rougeole du MSSS pour obtenir l'information la plus récente : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/rougeole/eclosion-de-rougeole#c265556>. Une mise à jour de la liste des lieux d'exposition sera effectuée, si d'autres informations sont obtenues dans le cadre de l'enquête qui se poursuit. Une intervention de santé publique est déployée auprès des contacts liés à ces lieux.

Compte tenu de cette nouvelle exposition à la rougeole à Montréal et de la situation épidémiologique à l'échelle mondiale, nous demandons aux professionnels de la santé de **vérifier leur propre statut de protection** contre la rougeole (voir l'**Annexe**) et, si considéré non-protégé, se faire vacciner immédiatement, afin d'éviter un isolement préventif si une exposition à un cas contagieux survenait. Nous recommandons de vérifier le statut de protection de l'ensemble du personnel œuvrant en milieu de soins.

Nous demandons aux professionnels de la santé de **signaler tout cas suspect de rougeole répondant aux indications de test** (voir la Recommandation #3 ci-dessous), sans attendre le résultat de laboratoire, pour accélérer les interventions de santé publique, dont la recherche de contacts et l'administration d'une prophylaxie aux personnes à risque de complications dans les courts délais prévus.

Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour recevoir les [appels à la vigilance et les mises à jour](#).

Pour joindre le professionnel de garde en maladies infectieuses : **514 528-2400**, 24 h/7 jours

RECOMMANDATIONS :

1. Être vigilant lors de la prise de rendez-vous, à l'accueil et au triage

- Identifier tout usager considéré non adéquatement protégé*, qui a été en contact avec un cas confirmé de rougeole, ou qui a voyagé ou été en contact avec un voyageur en provenance d'une [région endémique](#), et qui présente les manifestations cliniques suivantes :
 - Fièvre ($\geq 38,3^{\circ}\text{C}$) **et**
 - Éruption cutanée maculopapulaire **généralisée et**
 - Toux ou coryza ou conjonctivite.

*Il faut demeurer vigilant même chez les personnes adéquatement protégées qui sont considérées être des contacts ou qui ont des symptômes suggestifs de la rougeole ; la présentation clinique de la rougeole chez les personnes adéquatement protégées peut être atypique. Le vaccin n'étant pas efficace à 100 %, des cas de rougeole ont été recensés au Québec chez des personnes considérées protégées.

2. Appliquer rapidement les mesures de prévention et contrôle des infections

- Demander à l'usager de procéder à l'hygiène des mains et porter un masque médical ;
- Isoler l'usager dans une salle à pression négative ou, si non disponible, dans une salle d'examen avec porte fermée ;
- Appliquer les précautions additionnelles aériennes ;
- Si vous êtes un professionnel soignant, en cas de suspicion de rougeole porter un APR N95 ;
- Établir, au besoin, la liste des personnes exposées, incluant les usagers et leurs accompagnateurs, ainsi que le personnel.

3. Demander les tests de laboratoire appropriés en fonction de la date de l'évaluation médicale

- La rougeole est considérée comme [éliminée au Canada depuis 1998](#) ; la survenue d'un cas de rougeole est donc exceptionnelle et mène à des interventions de santé publique de grande envergure et intensité visant à stopper toute transmission.
- Suivre les [recommandations de l'INESSS](#) ci-dessous, en fonction des [lieux d'exposition](#) au Québec actuellement :

SITUATIONS EXIGEANT UNE ANALYSE DE LABORATOIRE

→ Une analyse de laboratoire afin de confirmer un cas de rougeole suspecté est indiquée dans les situations suivantes :

Présentation clinique CLASSIQUE de la rougeole	
Absence de lieu d'exposition au Québec*	Présence de lieux d'exposition au Québec*
Personne qui a : <ul style="list-style-type: none"> • un lien épidémiologique avec un cas de rougeole confirmé OU <ul style="list-style-type: none"> • fait un séjour dans une région où la rougeole est endémique.† 	<ul style="list-style-type: none"> • Toute personne
Présentation clinique NON CLASSIQUE compatible avec la rougeole	
Absence d'antécédent d'immunité	Personne immunisée contre la rougeole‡
Personne qui a : <ul style="list-style-type: none"> • un lien épidémiologique avec un cas de rougeole confirmé OU <ul style="list-style-type: none"> • fait un séjour dans une région où la rougeole est endémique.† OU <ul style="list-style-type: none"> • fréquenté un lieu d'exposition québécois connu dans les 21 derniers jours.* 	Personne qui a : <ul style="list-style-type: none"> • un contact connu et significatif avec un cas de rougeole confirmé. OU <ul style="list-style-type: none"> • Si vaccinée récemment‡ : fréquenté un lieu d'exposition québécois connu dans les 21 derniers jours.*

* Se référer au site Web dédié à l'écllosion de rougeole du MSSS, pour une liste actualisée des [lieux d'exposition](#) à la rougeole.

† Se référer au site Web de l'INSPQ pour des données actualisées sur les [pays](#) où la rougeole est endémique.

‡ Comprend notamment, les personnes qui sont suspectés d'être atteintes d'une rougeole modifiée ou de symptômes post-vaccination.

§ Dans ce contexte, il est difficile de distinguer entre des manifestations cliniques post-vaccinales et la rougeole sans faire d'analyses de laboratoire.



- Si un diagnostic de rougeole est suspecté, **confirmer le diagnostic avec un test approprié** selon les [recommandations de l'INESSS](#) ci-dessous^{1,2} :

OPTION D'ANALYSES DE LABORATOIRE

→ Deux types d'analyses de laboratoire permettent le diagnostic de la rougeole durant la phase aigüe.

Paramètres	DÉTECTION TAAN	SÉROLOGIE IgM
Utilité	<ul style="list-style-type: none"> • Détection directe de la présence du virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Détection d'anticorps produits précocement au cours de l'infection
Fenêtre de détection (en fonction du temps depuis le début de l'éruption cutanée)	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 14 jours - sensibilité maximale de 0 à 3 jours - déclin de la sensibilité après 7 jours 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 à 30 jours
Situation à risque de faux négatifs	<ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement sous-optimal • Mauvaises conditions de transport ou de conservation • Prélèvement effectué trop tardivement après le début de l'éruption cutanée • Antécédent de vaccination* 	<ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement effectué trop tôt ou trop tardivement après le début de l'éruption cutanée • Vaccination depuis plus de 2 mois
Situation à risque de faux positifs	<ul style="list-style-type: none"> • Antécédent de vaccination^{†,‡} 	<ul style="list-style-type: none"> • Infection par un autre virus qui cause des éruptions cutanées et de la fièvre (p. ex. parvovirus humain B19). • Présence du facteur rhumatoïde • Vaccination depuis moins de 2 mois

* Charge virale de la souche en circulation inférieure au seuil de détection en raison de l'action du système immunitaire.

† La souche vaccinale peut être détectée plus de 100 jours après la vaccination chez certaines personnes.

‡ Au Québec, lorsque le résultat est positif, un second TAAN est effectué automatiquement pour distinguer la souche vaccinale de celle en circulation.

i La sérologie IgG n'est généralement pas recommandée lorsqu'une rougeole aigüe est suspectée. Toutefois, elle pourrait être utile dans certains cas particuliers pour lesquels les autres analyses de laboratoires étaient non concluantes.

Elle peut servir à :

- démontrer une exposition antérieure au virus;
- confirmer un diagnostic dans certains cas particuliers si deux prélèvements sanguins espacés de 10 à 14 jours sont effectués; un prélèvement en phase aigüe et un prélèvement en phase de convalescence.

¹ Seulement le CHU Ste-Justine effectue les TAAN rougeole au Québec; lorsque l'échantillon est positif, il est automatiquement envoyé au LNM via le LSPQ.

² Éviter de faire déplacer un patient potentiellement contagieux vers un autre milieu de soins pour obtenir la sérologie lorsque le TAAN est disponible.

4. Déclarer rapidement les cas **confirmés** de rougeole, ainsi que les cas **fortement suspects** de rougeole (ayant été en contact avec un cas confirmé de rougeole, ou ayant voyagé ou été en contact avec un voyageur en provenance d'une **région endémique**)

- À la [Direction de santé publique de la région de résidence du cas](#). Pour Montréal, joindre le professionnel de garde en maladies infectieuses **par téléphone au 514-528-2400 (disponible 24 h/7 jours)**.
- Au service de prévention et contrôle des infections de votre établissement si applicable.
- Si le cas ne nécessite pas d'être hospitalisé, demander au cas de s'isoler à domicile jusqu'à l'obtention du résultat des analyses de laboratoire et, si le diagnostic est confirmé, jusqu'à 4 jours après le début de l'éruption maculopapulaire. Le cas sera rapidement contacté par la santé publique pour enquête épidémiologique.

5. Identifier les contacts du cas qui sont à risque de complications et administrer la prophylaxie appropriée

- **Vacciner** les personnes âgées de 6 mois et plus, considérées comme non protégées, dans les 72 heures qui suivent le 1^{er} contact avec un cas de rougeole. Voir la section [RRO : vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons](#) du PIQ.
- Certaines personnes à risque doivent recevoir des **immunoglobulines** (Ig) si la première exposition au cas contagieux remonte à moins de 7 jours. Voir l'**Annexe** et Voir la section Post-exposition à la rougeole [du Protocole d'immunisation du Québec](#) (PIQ).

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour recevoir les [appels à la vigilance et les mises à jour](#).

Pour joindre le professionnel de garde en maladies infectieuses : **514 528-2400**, 24 h/7 jours

ANNEXE SUR LA ROUGEOLE

SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA ROUGEOLE :

- **Prodrome**
 - Fièvre élevée ($\geq 38,3^{\circ}\text{C}$)
 - Conjonctivite
 - Coryza
 - Toux
 - Taches de Koplik (1 ou 2 jours avant éruption; voir image ci-contre)
- **Éruption maculopapulaire**
 - 2 à 4 jours après le début du prodrome
 - Débute au visage et au cou puis se généralise
 - Persiste au moins 3 jours et pouvant aller jusqu'à 7 jours.



PÉRIODE D'INCUBATION :

La période d'incubation (entre l'exposition au virus et le début des symptômes) est généralement de 7 à 14 jours, mais peut aller de 5 à 21 jours. L'éruption cutanée apparaît ensuite de 2 à 4 jours plus tard.

PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ :

La période de contagiosité débute 4 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et se poursuit jusqu'à 4 jours après. En l'absence d'éruption cutanée, on déterminera le début de la contagiosité comme étant le jour précédent le début des symptômes prodromiques et la fin serait 8 jours après le début des symptômes prodromiques.

PERSONNES CONSIDÉRÉES PROTÉGÉES CONTRE LA ROUGEOLE :

Catégorie	Nombre de doses de vaccin requises pour être considéré comme protégé		
	1 dose ^H	2 doses ^I	Aucune dose
Né depuis 1980		X	
Né dans les années allant de 1970 à 1979 :			
– stagiaire ou travailleur de la santé;		X	
– voyageur;		X	
– recrue militaire;		X	
– travailleur dans une garderie ou dans une école;	X		
– autre.	X		
Né avant 1970			X
Personne possédant une attestation médicale qui certifie qu'elle a contracté la rougeole avant le 1 ^{er} janvier 1996 ^J			X
Personne dont la sérologie démontre la présence d'anticorps contre la rougeole			X

^H Une dose de vaccin vivant à partir de l'âge de 1 an.

^I Deux doses de vaccin vivant à partir de l'âge de 1 an, suivant un intervalle de quatre semaines entre les doses.

^J Les cas confirmés lors de l'épidémie de 2011 devraient également être inclus dans cette catégorie

Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour recevoir les [appels à la vigilance et les mises à jour](#).

Pour joindre le professionnel de garde en maladies infectieuses : **514 528-2400**, 24 h/7 jours



PERSONNES À RISQUE DE COMPLICATIONS DE LA ROUGEOLE :

- Enfants de moins de 12 mois;
- Femmes enceintes réceptives nées en 1970 ou après (incluant les femmes enceintes nées entre 1970 et 1979 ayant reçu une seule dose de vaccin)^A;
- Personnes immunosupprimées suivantes^B :
 - les personnes greffées de moelle osseuse, peu importe leur âge, leur statut vaccinal et qu'elles aient eu ou non la rougeole;
 - les personnes immunosupprimées nées en 1970 ou après et n'ayant pas eu la rougeole (ou n'ayant pas de preuve qu'elles l'ont eue), peu importe leur statut vaccinal.

^A En post-exposition, les femmes enceintes nées entre 1970 et 1979 qui n'ont eu qu'une seule dose de vaccin contre la rougeole devraient recevoir des immunoglobulines. Cette ligne de conduite s'explique dans le cadre d'une intervention individuelle en post-exposition, le risque plus élevé de complications de la rougeole chez une femme enceinte justifiant une mesure additionnelle de protection.

^B Selon un avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) du 16 décembre 2011. Il revient au médecin traitant de déterminer si l'immunosuppression est significative et nécessite l'administration d'immunoglobulines. La classification des personnes immunosupprimées dans la catégorie des personnes vulnérables (à l'exception des personnes greffées de moelle osseuse) doit se faire à partir des antécédents de rougeole :

- Toute personne née au Canada avant 1970 est considérée comme ayant eu la rougeole ;
- Une personne née en 1970 ou après doit avoir une preuve (médicale ou de laboratoire) qui confirme qu'elle a eu la rougeole.

Liens utiles :

- [Fiche technique pour la gestion des cas et des contacts – La rougeole](#)
- [Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#)
- [Rougeole - Professionnels de la santé - MSSS \(gouv.qc.ca\)](#)
- [INESSS : Outil d'aide à la décision : Repérage et diagnostic de la rougeole](#)
- L'affiche [Alerte! Rougeole!](#)
- [CHU Sainte-Justine : Maladies éruptives, purpuras et dermites de l'enfant](#)

Inscrivez-vous à la liste d'envoi pour recevoir les [appels à la vigilance et les mises à jour](#).

Pour joindre le professionnel de garde en maladies infectieuses : **514 528-2400**, 24 h/7 jours