

Risque de surdoses sévères et de décès liés à la consommation d'un mélange de fentanyl et d'étodesnitazène présent dans les drogues de rue à Montréal

La direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) a été informée de la présence, sur le marché montréalais, d'un produit sous forme de pâte rouge/mauve contenant du fentanyl et de l'étodesnitazène. Il s'agirait de la première détection de l'étodesnitazène à Montréal. La DRSP de Montréal a été informée d'une hausse récente de consultations à l'urgence pour surdoses. Le lien avec ce nouveau produit reste à



Selon les analyses effectuées par le Service d'analyse des drogues de Santé Canada, les «concentrations approximatives observées en fentanyl et étodesnitazène semblent élevées par rapport à ce qui est habituellement observé dans [les] échantillons.» Les produits pourraient donc présenter un risque de surdose d'autant plus élevé.

L'étodesnitazène est un opioïde de synthèse qui aurait une puissance similaire au fentanyl. Il serait donc associé à des risques élevés de décès par arrêt respiratoire particulièrement chez des consommateurs qui pourraient y être exposés à leur insu, en combinaison avec le fentanyl. Pour renverser les effets d'une surdose, un plus grand nombre de doses de naloxone pourrait être nécessaire. En cas de surdose, appelez le 911 immédiatement pour une intervention rapide et optimale. Une prise en charge en milieu hospitalier pour administration de naloxone sous supervision médicale ou gestion des voies respiratoires pourrait être requise.

Nous vous invitons à être vigilants et à nous informer de toute situation suggérant une exposition à cette drogue nouvellement identifiée à Montréal en utilisant la [fiche de signalement de surdose](https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Surdoses/Alertes-outils/Fiche_Signalement_Surdose_vfinale_septembre2021.pdf).
(https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Surdoses/Alertes-outils/Fiche_Signalement_Surdose_vfinale_septembre2021.pdf)

La DRSP de Montréal invite les consommateurs de drogues de rue, quel que soit le mode de consommation (par ingestion, injection, par inhalation ou autre), à être prudents et encourage cliniciens et intervenants à rehausser les interventions de prévention des décès auprès de ceux-ci :

1. Faire circuler l'information concernant le risque de surdose sévère et de décès suite à la consommation de ce nouveau produit.
2. Offrir un counseling sur les pratiques de consommation à risques réduits :
 - pour les personnes qui consomment par injection, fréquenter régulièrement les services de consommation supervisée : <https://santemontreal.qc.ca/population/services/services-dinjection-supervisee/>
 - éviter de consommer seul
 - lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps
 - utiliser, si possible, des bandelettes de détection du fentanyl sachant que l'étodesnitazène ne peut être détecté par cette mesure
 - avoir de la naloxone disponible en quantité suffisante et savoir l'utiliser lorsqu'une personne présente des signes de surdose
 - appeler le 911 en cas de surdose (la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose assure l'immunité contre les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911)
3. Renseigner et accompagner au besoin les personnes afin d'obtenir gratuitement la naloxone dans les organismes et pharmacies communautaires inscrits dans le répertoire de l'INSPQ. Les organismes communautaires montréalais inscrits dans ce répertoire distribuent gratuitement des bandelettes de détection du fentanyl : <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html>

Pour plus d'informations : <https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/surdoses/prevention-des-surdoses-liees-aux-drogues/>