

Projet suprarégional d'analyse de drogues dans l'urine de personnes qui consomment au Québec – 2023


Résultats de la région de Montréal



Description du projet

- Questionnaire rempli par les consommateurs sur leur consommation de drogues, leur expérience de surdose et la réduction des méfaits
- Collecte et analyse d'un échantillon d'urine
- 1140 participants, dans 11 régions du Québec, du 8 septembre au 22 octobre 2023
- Critères de recrutement: Avoir consommé au moins une drogue dans les 3 derniers jours (excluant le cannabis) et avoir 18 ans ou +

Résultats pour les 279 participants de Montréal recrutés dans 9 organismes



Principales substances <u>rapportées</u> consommées (<3 jours)	Principales substances <u>détectées</u> dans l'urine	Autres substances d'intérêt <u>détectées</u> dans l'urine
<ul style="list-style-type: none"> • Crack et freebase..... 76 % • Crystal meth..... 32 % • Speed 25 % • Cocaïne en poudre..... 25 % • Hydromorphone..... 24 % • Fentanyl..... 13 % • Méthadone.....13% • Benzodiazépines commercialisées.....10% 	<ul style="list-style-type: none"> • Cocaïne..... 90 % • Méthamphétamine..... 61 % • Hydromorphone..... 24 % • Fentanyl et analogues..... 21 % • Méthadone..... 14 % • Bromazolam..... 11 % • Benzodiazépines commercialisées.....9% • Morphine..... 9 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Carfentanyl..... 1 % • Nitazènes 4 % • Xylazine..... 4 % • Héroïne..... 2 % • Cathinones.....1% • Médétomidine 0 %

Associations entre les substances consommées et celles retrouvées dans l'urine

Plusieurs consommateurs auraient consommé certaines substances à leur insu :

- Parmi la totalité de l'échantillon, du fentanyl a été détecté chez **7%** des participants qui ont dit ne pas en avoir consommé dans les 3 derniers jours;
- Parmi les participants chez qui des **nitazènes** ont été détectés dans l'urine, **70%** ont rapporté la consommation de **fentanyl** dans les 3 derniers jours;
- Parmi les participants chez qui des **benzodiazépines non commercialisées** (ex : bromazolam, étizolam) ont été détectées dans l'urine, **94%** ont rapporté la consommation de **fentanyl** dans les 3 derniers jours;
- Parmi les participants chez qui de la xylazine a été détectée dans l'urine, **100%** ont rapporté la consommation de **fentanyl** dans les 3 derniers jours;
- De la **méthamphétamine a été détectée** chez **83%** des participants qui rapportent avoir consommé du **speed** dans les 3 derniers jours, mais aucune autre forme de méthamphétamine. On ne détecte presque jamais d'amphétamine chez ces participants.

Surdoses involontaires (rapportées) dans les 6 derniers mois, par famille de substances

- Opioides : 11 %
- Stimulants : 10 %
- Autres substances : 3 %