


ACTIVITÉ 1: LA CONTRACEPTION À VOS TROUSSES!

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT 1 – FICHE DESCRIPTIVE SUR LE CONDOM



CONDOM MASCULIN (méthode barrière)

<p>Description</p> <p>Enveloppe de latex, de polyuréthane ou de polyisoprène dont l'homme recouvre son pénis en érection. Comme le sperme est retenu dans le condom lors de l'éjaculation, il ne peut féconder l'ovule.</p> <p>Les condoms en membrane naturelle ou en peau d'agneau utilisés en cas d'allergie ne protègent pas des ITS.</p> <p>Pour ceux et celles qui sont allergiques au latex, il est possible d'utiliser d'autres sortes de condoms faits en polyuréthane ou en polyisoprène, vendus en pharmacie.</p>	<p>Mode d'utilisation</p> <p>Le condom doit être mis en place avant le contact du pénis avec les organes génitaux.</p> <p>Après l'éjaculation, l'homme doit retirer son pénis du vagin avant de perdre son érection pour enlever le condom, qu'il doit bien tenir contre la base du pénis pour éviter tout écoulement de sperme.</p> <p>Le condom est jeté après utilisation.</p> <p>Il faut utiliser un nouveau condom à chaque pénétration.</p>
<p>Efficacité</p> <p>S'il est bien utilisé, le condom offre une efficacité de près de 98%.</p>	<p>Coût</p> <p>Environ 7 \$ pour une boîte de 12.</p>
<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> · Méthode qui offre aussi une certaine protection contre les ITS. · Méthode peu coûteuse. · Permet au partenaire masculin d'assumer une part des responsabilités en matière de contraception. · Les deux partenaires peuvent procéder à son utilisation. · Possibilité de trouver des façons érotiques d'intégrer le condom au déroulement de l'acte sexuel. · Le condom modifie peu la sensation sexuelle et peut même aider à retarder l'éjaculation. · Pas besoin d'ordonnance, car les condoms sont en vente dans les pharmacies et certains endroits publics. · Plusieurs marques et modèles (taille, épaisseur, texture et saveur) sont offerts sur le marché, donc il y a beaucoup de choix. 	<p>Désavantages</p> <ul style="list-style-type: none"> · Certains trouvent que le condom brise la spontanéité de leurs caresses amoureuses. · Il doit être porté dès qu'il y a la plus légère pénétration dans le vagin et demande donc une grande vigilance. · S'il est utilisé avec du spermicide, cela peut augmenter le risque de contracter le VIH parce que le condom peut causer des irritations aux voies vaginales ou au rectum. · Les personnes allergiques au latex peuvent utiliser des condoms de polyuréthane et de polyisoprène. · Il doit être manipulé avec soin, car il peut y avoir danger de déchirure. · Plusieurs mises en garde concernant la conservation et l'utilisation du condom doivent être connues et respectées.
<p>Rôle du partenaire</p> <p>Les deux partenaires peuvent participer à l'achat des condoms et s'en partager le coût. De plus, ils peuvent tous deux participer à l'installation du condom lors de la relation sexuelle. Les partenaires doivent s'assurer que le mode d'emploi est bien respecté.</p>	