

ACTIVITÉ 1 : DIS-MOI CE QUE TU FAIS, JE TE DIRAI CE QUE TU RISQUES !

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT 5 – RISQUE DE TRANSMISSION LIÉ AUX ITSS POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS / NOTES À L'INTERVENANT

1* Partager un rasoir

Le risque de transmission est très faible, mais il est quand même présent car le VIH et le Virus de l'hépatite C (VHC) se transmettent par le sang.

4* Masturbation mutuelle

Si le sperme ou les sécrétions vaginales ne sont pas utilisés comme lubrifiant, le risque est nul.

*6 + *12 Rapport sexuel oral génital avec condom

Le condom ne couvre pas toutes les zones génitales. Il ne protège pas de l'herpès et du VPH s'il y a contact avec des zones non couvertes.

8* Utilisation d'aiguilles non stérilisées lors d'un tatouage ou d'un perçage

Tout comme pour le partage des rasoirs, l'utilisation d'aiguilles non stériles comporte un risque de transmission du VIH considéré comme faible. Cependant, le risque de transmission des hépatites B et C est plus élevé.

10* Frottement des organes génitaux

Le risque est faible, sauf pour la syphilis, l'herpès et le VPH en cas de contact direct avec les lésions. Le risque de transmission du VIH et du VHC est négligeable.

12* Baiser avec échange de salive (*french kiss*)

Il n'y a pas de risque, à moins que la bouche comporte des lésions (maladie des gencives, plaies et présence de sang, etc.). Il y a un risque de transmission de l'herpès s'il y a présence de plaie sur les lèvres.

13* Pénétration vaginale ou anale avec condom

Après l'abstinence, le condom est le meilleur moyen de protection s'il y a pénétration. Il n'y a pas de risque, sauf si le condom se brise. Il peut aussi rester dans le vagin ou l'anus s'il est mal utilisé. À noter que le condom ne protège pas de l'herpès et du VPH s'il y a contact avec des zones qu'il ne couvre pas. Pour la pénétration anale, il faut choisir des condoms plus résistants conçus à cet effet.

14* Rapport sexuel oral génital (bouche vulve ou bouche-pénis) sans condom

Le risque de transmission du VIH et d'autres ITS est faible, sauf en cas de lésion dans la bouche ou sur les organes génitaux du partenaire. Il est élevé dans le cas de certaines autres infections telles que l'herpès.