

## **Réserve pharmaceutique de base pour les soins palliatifs à domicile (au moins 10-20 doses)**

Acide valproïque solution orale 50 mg/ml (usage rectal lors de dysphagie terminale chez des patients ayant convulsé et qui ne peuvent plus avaler Frisium ou Keppra, car Dilantin moins efficace en cancer)

Dexaméthasone injection 4mg/ml (5ml)  
Dexaméthasone injection 10mg/ml (10ml)

Lorazepam sous-lingual 0.5mg, 1mg, 2mg  
Lorazepam comprimés réguliers 0.5mg, 1mg, 2mg

Haloperidol injection SC (on utilise la formulation IM), 5mg/ml (1ml)  
Haloperidol comprimé 0.5mg, 1mg, 2mg, 5mg, 10mg

Hydromorphone 1 mg/ml solution orale  
Hydromorphone co courte actions de 1, 2 et 4 mg  
Hydromorphone longue action : 3, 6, 9, 12, 18, 24 et 40 mg  
Hydromorphone injectable 1mg/ml, 2 mg/ml, HP 10 mg/ml, HP 20 mg/ml et 50 mg/ml

Lovenox 30/0,3 ml, 60/0, 6 ml, 100/ml pour anticoagulation en urgence

Midazolam injectable 5 mg/ml (ampoules de 1 ml)

Morphine solution orale : 1mg/ml, 5mg/ml, 10mg/ml  
Morphine : comprimés courte action de 1, 5 et 10 mg  
Morphine longue action 12 heures, capsules qui s'ouvrent au besoin (M-Eslon) 10 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg et 100 mg, OK aussi pour les cancers ORL  
Morphine injectable 2mg/ml, 10mg/ml, 15mg/ml (ampoules de 1ml)  
Morphine injectable HP 25 mg et 50mg/ml (vials de 10ml)

Métoclopramide injectable 5mg/ml (2ml et 30ml), 5mg/10ml (10ml)  
Métoclopramide solution orale de 1mg/ml  
Métoclopramide co de 5mg et 10 mg

Methotrimeprazine (Stemetil) injectable 25 mg/ml, ampoules de 1 ml, mais aussi les co de 5 mg et les suppositoires de 10 mg

Naloxone (Narcan) injectable (si grave surdosage, dilué dans 500 ml NaCl, 0,01 mg/kg/départ)

Phénobarbital injectable, 120 mg/ml pour les convulsions réfractaires et les sédations palliatives réfractaires au midazolam  
(A venir/la loi 2 : Propofol IV pour les sédations réfractaires au midazolam et phénobarbital).

Robinul (hyoscine butylbromide) injectable 20mg/ml (1ml)  
Scopolamine injectable 0,4 ml/ml (plus sédatif que le robinul donc notre préféré)

Vitamine K 5 à 10 mg dans sirop simple (INR dangereusement élevé)