

Nom :

Prénom :

#Dossier :

Légende 1 : Niveau de sédation – Échelle de vigilance – Agitation de Richmond (RASS)			
Niveau	Description	Définition	
+4	Combatif	Combatif ou violent, danger immédiat envers l'équipe.	
+3	Très agité	Tire, arrache tuyau et cathéters et/ou agressif envers l'équipe.	
+2	Agité	Mouvements fréquents et/ou désadaptation au respirateur.	
+1	Ne tient pas en place	Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés peu fréquents, non vigoureux, non agressifs.	
0	Éveillé et calme		
-1	Somnolent	Non complètement éveillé, mais contact visuel à l'appel plus de 10 secondes.	
-2	Diminution de la vigilance	Ne reste éveillé que brièvement avec contact visuel moins de 10 secondes.	
-3	Diminution modérée de la vigilance	N'importe quel mouvement à l'appel sans contact visuel.	
-4	Diminution profonde de la vigilance	Aucune réponse à l'appel, mais n'importe quel mouvement à la stimulation physique (secousse ou friction non-nociceptive de l'épaule ou du sternum).	
-5	Non éveillable	Aucune réponse, ni appel, ni à la stimulation physique (secousse ou friction non-nociceptive de l'épaule ou du sternum).	
Objectif thérapeutique à atteindre : Niveau -3, -4, -5.			
Légende 2 : Signes d'inconfort chez les patients comateux ou sous sédation palliative (tiré de l'échelle NCS)			
Éléments observés		États	
Visage		D = Détendu	T,C = Tendus, crispés
Geignements		A = Absents	P = Présents
Membres		S = Souples	RA = Raides
			TG = Tordeur grimaçant
			RI = Rigides
Légende 3 : Signes de dyspnée, de détresse et de dépression respiratoires (tiré de l'échelle RDOS)			
Fréquence cardiaque – Pouls/min.	Moins de 90	90 à 109	Plus de 110
Rythme respiratoire/min.	Moins de 8 (dépression respiratoire)	Plus de 19	19 à 29
Tirage	N = Non	O = Oui	
Pause respiratoires – apnée	N = Non	O = Oui	
Forts ronflements	N = Non	O = Oui	
Si détresse respiratoire avec période d'apnée et forts ronflements surtout en début de sédation – aviser le médecin.			
Fréquence de surveillance : aux 15 à 20 minutes jusqu'à obtention de la SPC, ensuite aux 2 heures pour les soins de confort. À adapter selon le milieu de soins.			

Source: CIUSSS-CCSMTL (2019-11-08)